

2019年3月13日

日本ケミファ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目2番3号

TEL:03-3863-1211(代表) / FAX:03-3864-5940

ドネペジル塩酸塩錠 3mg/5mg/10mg「ケミファ」および ドネペジル塩酸塩 OD 錠 3mg/5mg/10mg「ケミファ」の 効能又は効果ならびに用法及び用量の追加承認に関するお知らせ

日本ケミファ株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:山口 一城)は、本日3月13日、ドネペジル塩酸塩錠 3mg/5mg/10mg「ケミファ」およびドネペジル塩酸塩 OD 錠 3mg/5mg/10mg「ケミファ」(3mg、5mgは2011年11月、10mgは2013年12月に薬価収載)について、「レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制」の効能又は効果ならびに用法及び用量の追加が承認されましたのでお知らせいたします。

これにより、効能又は効果ならびに用法及び用量は先発医薬品と同一となりました。

◆追加承認後の効能又は効果ならびに用法及び用量(下線部分が追加箇所、ドネペジル塩酸塩錠・OD錠共通)

効能又は効果	用法及び用量
<p>アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制</p>	<p>アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制 通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1~2週間後に5mgに増量し、経口投与する。高度のアルツハイマー型認知症患者には、5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。 なお、症状により適宜減量する。</p> <p>レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制 通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1~2週間後に5mgに増量し、経口投与する。<u>5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。</u> なお、症状により5mgまで減量できる。</p>

以上